

Состав

действующее вещество: пижмы цветки.

Лекарственная форма

Цветки.

Основные физико-химические свойства: измельченное сырье: цельные цветочные корзинки, отдельные трубчатые цветки, цветоложа и их кусочки, кусочки цветоносов; цвет желтый, буровато-зеленый, светло-зеленый; порошок крупный: смесь кусочков цветоложе, цветоносов, цельных или измельченных трубчатых цветков; цвет желтый, буровато-зеленый, светло-зеленый.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТХ А05А Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают желчегонное, противомикробное, противоглистное, фитонцидным, вяжущее и противовоспалительные действия.

Показания

Аскаридоз, острицы; заболевания печени и желчевыводящих путей (холециститы, ангиохолиты) желудочно-кишечные заболевания (гастриты с пониженной кислотностью, колиты, энтероколиты).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Гепатиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде за 15 мин до еды: взрослым - по 1 столовой ложке 3-4 раза в сутки.

Перед применением настой взболтать.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат не применять детям.

Передозировка

Диспепсические расстройства, рвота, в тяжелых случаях - судороги.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При появлении побочных реакции следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

Измельченное сырье: по 75 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.