Состав

действующее вещество: камфора рацемическая;

1 мл препарата содержит 0,1 г камфоры рацемической;

вспомогательные вещества: масло подсолнечное.

Лекарственная форма

Масло для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желтого цвета с запахом камфары.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно против суставной и мышечной боли.

Код ATX M02A X10.

Фармакодинамика

Камфорная масло при местном применении оказывает противомикробное, противовоспалительное, отвлекающее, обезболивающее действие и устраняет зуд кожи.

Эти свойства обусловлены наличием в молекуле камфоры функционально активной молекулы кислорода, которая имеет высокий окислительный потенциал, нарушает клеточные мембраны микроорганизмов, разрушает много активных соединений, вызывающих воспаление, боль и раздражение чувствительных рецепторов кожи.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не определялась.

Показания

Назначают при ревматизме, артритах, артралгии, миозитах, ишиасе, кожном зуде.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма, повреждения кожи при ожогах, нарушение целостности кожи, гнойничковые заболевания кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие пока еще не известна.

Особенности применения

Только для наружного применения. Избегать контакта препарата с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. Не втирать в ноздри. В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае появления таких реакций следует прекратить применение препарата и смыть его остатки из мест нанесения теплой водой с мылом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не исследовались.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применяется с учетом соотношения польза для/риск для плода (ребенка), которое определяет врач.

Способ применения и дозы

Камфорное масло применяют наружно взрослым как отдельно, так и в комбинации с метилсалицилатом, скипидаром и другими лекарственными средствами для местного применения. Применяют наружно для растирания и компрессов при указанных патологических процессах. Способ применения, количество аппликаций, продолжительность одной аппликации обусловленные характером заболевания, его выраженностью, характером сопутствующей терапии.

Дети

Не назначают детям из-за отсутствия клинического опыта.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций, чувство сильного тепла и жжение.

При случайном попадании внутрь возможны боли в животе, тошнота, рвота, диарея, симптомы угнетения центральной нервной системы, головокружение, атаксия, судороги, приливы, сонливость, затруднение дыхания.

Побочные реакции

Со стороны кожи: аллергические реакции, включая сыпь, крапивницу, зуд, раздражение кожи, покраснение, дерматит, включая контактный дерматит.

Со стороны нервной системы: судороги.

Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 мл в флаконе, в пачке или без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г.. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —

Государственного реестра лекарственных средств Украины.