

## **Состав**

*действующее вещество:* камфора рацемическая;

1 мл препарата содержит 0,1 г камфоры рацемической;

*вспомогательные вещества:* масло подсолнечное.

## **Лекарственная форма**

Масло для наружного применения.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость желтого цвета с запахом камфары.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые местно против суставной и мышечной боли.

Код АТХ M02A X10.

## **Фармакодинамика**

Камфорная масло при местном применении оказывает противомикробное, противовоспалительное, отвлекающее, обезболивающее действие и устраняет зуд кожи.

Эти свойства обусловлены наличием в молекуле камфоры функционально активной молекулы кислорода, которая имеет высокий окислительный потенциал, нарушает клеточные мембраны микроорганизмов, разрушает много активных соединений, вызывающих воспаление, боль и раздражение чувствительных рецепторов кожи.

## **Фармакокинетика**

Фармакокинетика не определялась.

## **Показания**

Назначают при ревматизме, артритах, артралгии, миозитах, ишиасе, кожном зуде.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма, повреждения кожи при ожогах, нарушение целостности кожи, гнойничковые заболевания кожи.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Взаимодействие пока еще не известна.

### **Особенности применения**

Только для наружного применения. Избегать контакта препарата с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. Не втирать в ноздри. В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае появления таких реакций следует прекратить применение препарата и смыть его остатки из мест нанесения теплой водой с мылом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не исследовались.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применяется с учетом соотношения польза для/риск для плода (ребенка), которое определяет врач.

### **Способ применения и дозы**

Камфорное масло применяют наружно взрослым как отдельно, так и в комбинации с метилсалицилатом, скипидаром и другими лекарственными средствами для местного применения. Применяют наружно для растирания и компрессов при указанных патологических процессах. Способ применения, количество аппликаций, продолжительность одной аппликации обусловленные характером заболевания, его выраженностью, характером сопутствующей терапии.

### **Дети**

Не назначают детям из-за отсутствия клинического опыта.

### **Передозировка**

Возможно усиление проявлений побочных реакций, чувство сильного тепла и жжение.

При случайном попадании внутрь возможны боли в животе, тошнота, рвота, диарея, симптомы угнетения центральной нервной системы, головокружение, атаксия, судороги, приливы, сонливость, затруднение дыхания.

### **Побочные реакции**

*Со стороны кожи:* аллергические реакции, включая сыпь, крапивницу, зуд, раздражение кожи, покраснение, дерматит, включая контактный дерматит.

*Со стороны нервной системы:* судороги.

*Со стороны дыхательной системы:* бронхоспазм.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 30 мл в флаконе, в пачке или без пачки.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

69063, Украина, г.. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —

[Государственного реестра лекарственных средств Украины.](#)