

Состав

действующие вещества: левоментол, камфора, масло эвкалиптовое, масло гвоздичное;

1 г мази содержит левоментола - 180 мг, камфоры - 100 мг, масла эвкалиптового - 100 мг, масла гвоздичного - 10 мг;

вспомогательные вещества: парафин, парафин желтый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или желтоватого цвета, с характерным запахом. Мазь по внешнему виду должна быть однородной.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТХ M02A X10.

Фармакодинамика

При наружном применении препарат раздражает нервные окончания кожи, оказывает отвлекающее, местное обезболивающее, противовоспалительное и противомикробное действие при воспалении, боли в суставах и мышцах.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Симптоматическое лечение невралгии, миалгии, артрита, ревматизма, ишиаса.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Раны в месте нанесения препарата, дерматит, коклюш, экзема, склонность к бронхоспазму или судоргам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Не наносить на слизистые оболочки! Не допускать попадания препарата в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

При втирании в кожу вызывает ощущение холода, потом теплоты, слабого жжения и покалывания.

Не следует наносить мазь на поврежденную кожу.

После каждого применения мази тщательно мыть руки.

При сильном раздражении кожи втирание следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременным и женщинам в период кормления грудью лечение назначает врач в случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Мазь применять наружно для растирания.

2-3 г препарата легко втирать до полного впитывания в пораженный участок тела и прилегающий участок кожи 2-3 раза в сутки.

Кратность применения и длительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера заболевания, его выраженности, достигнутого эффекта, вида базисной терапии.

Дети

Детям до 12 лет не рекомендуется применять препарат.

Передозировка

Ощущение сильного тепла и жжение в месте нанесения мази или усиление проявлений побочных реакций. Аллергические реакции (крапивница, кожный зуд) при повышенной чувствительности к препарату. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая покраснение кожи, зуд, кожные высыпания, крапивницу, контактный дерматит.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возможно возникновение судорог, вызванное камфарой.

Нарушения в месте введения: покраснение кожи, зуд, у детей может возникнуть дерматит.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 г в контейнерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).