

## **Состав**

*действующие вещества:* ментол рацемический, камфора рацемическая, тимол, пихтовое масло (Pine oil), эвкалиптовое масло (Eucalyptus oil), мускатный масло (Nutmeg oil)

1 г мази содержит ментола рацемического 30,5 мг камфоры рацемической 52,5 мг тимола 1 мг пихтового масла (Pine oil) 0,0555 мл эвкалиптового масла (Eucalyptus oil) 0,015 мл мускатного масла (Nutmeg oil) 0,0055 мл

*вспомогательные вещества:* парафин белый мягкий.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* белая полупрозрачная мазь с сильным специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комбинированные препараты для применения при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

## **Фармакодинамика**

Механизм действия препарата обусловлен действующими веществами и заключается в раздражении нервных окончаний, рефлекторном расширении артериол и капилляров. Препарат оказывает отвлекающее, местнораздражающее, обезболивающее действие, умеренное противовоспалительное, антисептическое, спазмолитическое действие.

## **Показания**

Комплексная терапия острых респираторных заболеваний, сопровождающихся ринитом, ощущением заложенности носа, кашлем, головной болью.

Боль в суставах и мышцах, невралгия, миозит, артрит, миалгия, артралгия, ревматизм, ишиас.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма, коклюш, псевдокрупом, склонность к судорогам; нарушение целостности кожи, в том числе при ожогах, гнойничковых заболеваниях кожи.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

### **Особенности применения**

Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. Не следует наносить мазь на поврежденную кожу.

При втирании в кожу возникает ощущение холода, затем теплоты, слабого жжения и покалывания.

После каждого использования мази тщательно мыть руки. При сильном раздражении кожи втирания следует прекратить.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Обычно не влияет, но следует учитывать возможность возникновения головокружения и судом.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Из-за отсутствия опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью назначать этой категории пациентов не рекомендуется.

### **Способ применения и дозы**

Наружно для растираний. Взрослым и детям старше 6 лет мазь наносят тонким слоем 2-4 раза в сутки:

- при насморке или при заложенности носа мазь наносить на неповрежденную кожу крыльев носа;
- при кашле, связанном с простудными заболеваниями мазь наносить на верхние участки грудной клетки и шеи и в течение 3-5 минут осторожно втирать легкими массирующими движениями;
- при головной боли мазь наносить на кожу висков;

- при болях в суставах и мышцах, невралгии, миозите, артрите, миалгии, артралгии, ревматизме, ишиасе втирать в кожу пораженного участка, этап накладывать теплую повязку.

Детям в возрасте от 3 до 5 лет мазь наносят тонким слоем на верхнюю область спины 2-3 раза в сутки, но ни в коем случае не на лицо и крылышки носа.

Курс лечения составляет 3-5 суток.

## **Дети**

Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 3 лет исследованы недостаточно. Детям в возрасте от 3 лет применять с осторожностью, по рекомендации и под наблюдением врача.

## **Передозировка**

Ощущение сильного тепла и жжение в месте нанесения мази, возможно усиление проявлений побочных реакций. При случайном попадании внутрь возможны боли в животе, тошнота, рвота, диарея, симптомы угнетения центральной нервной системы, головокружение, атаксия, судороги, приливы, сонливость, затрудненное дыхание.

Лечение смыть нанесенный препарат водой с мылом, промывание желудка, симптоматическая терапия.

## **Побочные реакции**

*Со стороны кожи и подкожной ткани:* возможны аллергические реакции, в т.ч. гиперемия, зуд, сыпь, крапивница, раздражение кожи, дерматит, включая контактный дерматит, особенно у детей.

*Со стороны нервной системы:* головная боль, головокружение, возбуждение, возможно возникновение судорог, вызванных камфарой.

*Со стороны дыхательной системы:* возможно увеличение вероятности и частоты возникновения бронхоспазма, особенно у детей.

При появлении побочных реакций лечение немедленно следует прекратить.

## **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в плотно закупоренной таре при температуре не выше 25 ° в защищенном от света и недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 25 г в банке в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).