

## **Состав**

*действующие вещества:* 100 мл раствора содержит бензокаину 1 г прокаина гидрохлорида 1 г, ментола рацемического 2,5 г.

*вспомогательные вещества:* этанол 70%.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения, спиртовой.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость с запахом ментола.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТХ М02А Х.

## **Фармакологические свойства**

Препарат обладает противозудным действием и местноанестезирующее эффект. При нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания.

Оказывает легкое обезболивающее действие.

## **Фармакокинетика**

При местном применении препарат не поступает в кровяное русло.

## **Показания**

Препарат назначают при невралгиях, миалгиях, артралгиях.

## **Противопоказания**

Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаина и других составляющих компонентов препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Компоненты препарата (новокаин, анестезин) ослабляют антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов. Усиливают эффекты препаратов с местноанестезирующим действием.

*При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.*

### **Особенности применения**

Не наносить на поврежденную кожу и кожу с проявлениями аллергии. Не наносить на кожу лица.

*Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.*

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Препарат применяют наружно. Болезненные участки кожи растирают Меновазином 2-3 раза в сутки. Курс лечения зависит от формы, тяжести заболевания, эффекта препарата, а также от характера лечения (монотерапия или в комплексе с другими лекарственными средствами).

### **Дети**

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

## **Передозировка**

При длительном применении возможны головокружение, общая слабость, снижение артериального давления, аллергические реакции. При появлении таких симптомов препарат следует отменить, остатки смыть с поверхности кожи водой, провести симптоматическую терапию.

## **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (гиперемия, раздражение кожи, зуд, сыпь, отек, крапивница).

*В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!*

## **Срок годности**

2 года.

*Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.*

## **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 40 мл во флаконе в пачке или без пачки.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ООО "Микрофарм", Украина.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Производитель

ООО «Микрофарм».

Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Заявитель

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).