

Состав

действующее вещество: настойка плодов перца стручкового (Fructus Capsici) (1:10) (экстрагент - этанол 90%);

1 флакон содержит настойки плодов перца стручкового (Fructus Capsici) (1:10) (экстрагент - этанол 90%) - 50 мл.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: жидкость желто-оранжевого цвета. Возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Код АТХ М02А В.

Фармакодинамика

Препарат оказывает местнораздражающее действие и при нанесении на кожу действует подобно горчицика.

Показания

Перца стручкового настойку применять как местный раздражающее и отвлекающее средство при миалгия, невралгия, люмбаго, артритах, ревматизме.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость любого из компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Избегать попадания препарата в глаза. В случае попадания в глаза следует тщательно промыть их большим количеством проточной воды. Не наносить препарат на места с острым воспалительным процессом кожи или на поврежденную кожу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не исследована.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническую эффективность настойки в период беременности и кормления грудью не изучали, поэтому в этот период препарат не следует применять.

Способ применения и дозы

Применять наружно. Настойкой растирать больные места 1-2 раза в день до появления в них ощущение тепла или легкого покалывания. Для усиления действия препарата рекомендуется сухое согревающее укутывание болезненных мест.

Продолжительность применения препарата зависит от степени воспалительного процесса и чувствительности кожи больного к препарату.

Дети

Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены, поэтому детям до 12 лет препарат не следует назначить.

Передозировка

Случаи передозировки не наблюдалось.

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится, но в отдельных случаях при индивидуальной чувствительности возможно появление аллергических реакций: чувство жжения, покраснение кожи, зуд, сыпь в месте нанесения.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г.. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).