

## **Состав**

*действующие вещества:* 2,0 мл раствора содержат: Acidum silicicum D8 - 83 мг, Berberis vulgaris D4 - 143 мг, Bryonia D4 - 143 мг, Calcium hypophosphorosum D3 - 83 мг, Cinchona pubescens D4 - 83 мг, Coffeinum monohydricum D4 - 83 мг, Colchicum autumnale D4 - 143 мг, Convallaria majalis D4 - 83 мг, Echinacea D4 - 83 мг, Ferrum phosphoricum D10 - 83 мг, Formica rufa D10 - 83 мг, Formica rufa D4 - 83 мг, Formica rufa D6 - 83 мг, Lithium chloratum D3 - 83 мг, Rhus toxicodendron D4 - 146 мг, Salix alba D4 - 143 мг, Smilax D4 - 143 мг, Solidago virgaurea D3 - 83 мг

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

## **Лекарственная форма**

Раствор для инъекций.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Препарат метаболического, противовоспалительного, обезболивающего, противоревматического, диуретического, антисептического действия. Действие лекарственного средства основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в его состав.

## **Показания**

В составе комплексного лечения мочекишлого диатеза, подагры, мочекаменной диатеза, нарушений пуринового обмена, артритов.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Ревматизм, новообразования.
- Период беременности и кормления грудью.

- Возраст до 12 лет.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

О случаях взаимодействия не сообщалось, и они не предусматриваются благодаря гомеопатическим разведением, содержащиеся в препарате.

Вследствие иммуностимулирующего действия эхинацея может уменьшать эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие. Необходимо сообщить врачу обо всех препаратах, которые применялись в последнее время, даже если они отпускаются без рецепта.

### **Особенности применения**

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется применять больным с туберкулезом, саркоидозом, заболеваниями системы крови (лейкозы, лейкемии), аутоиммунными заболеваниями, иммунодефицитом.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на дозу, то есть практически свободный от натрия.

В начале лечения лекарственным средством возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 1 ампула по 2,0 мл. Применять разовую дозу в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций - 1-3

раза в неделю.

Курс лечения - 4-6 недель.

### Инструкция для открытия стеклянного флакона (ампулы)

Открывать осторожно. Следуйте этой инструкции.

Разрезать стеклянную ампулу не обязательно. Держите ампулу верхней частью вверх под наклоном; жидкость, которая находится в верхней части ампулы, встряхните вниз. Отломите верхнюю часть ампулы, где находится цветная отметка.

Неиспользованный остаток раствора вылить.

### **Дети**

Лекарственное средство рекомендуется для детей от 12 лет.

### **Передозировка**

Возможно усиление побочных реакций; при применении высоких доз препарата возможно возникновение тошноты, рвоты, диареи, бессонницы, повышенного возбуждения.

### **Побочные реакции**

В редких случаях могут возникать временные аллергические реакции, изменения в месте введения, тошнота, рвота, диарея, боль в животе. При применении препаратов, содержащих эхинацею, наблюдались высыпания на коже, зуд, крапивница, возбуждение, нарушение сна.

### **Срок годности**

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте!

*Несовместимость.* Неизвестна. Препарат не следует смешивать с другими препаратами в одной емкости, кроме препаратов производителя «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ» (Biologische Heilmittel Heel GmbH).

**Упаковка**

5 ампул по 2,0 мл в картонной коробке.

**Категория отпуска**

По рецепту.

**Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).