

## **Состав**

*действующее вещество:* кислота муравьиная;

100 мл препарата содержат кислоты муравьиной 1,4 г;

*вспомогательные вещества:* этанол 70%.

## **Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения спиртовой.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная, бесцветная жидкость со специфическим резким запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ M02A X10.

## **Фармакодинамика**

Спирт муравьиный относится к средствам, которые раздражают чувствительные нервные окончания. Вследствие стимуляции рецепторов кожи и подкожных тканей препарат оказывает не только рефлекторное, но и общий гуморальный влияние. Раздражение спиртом муравьиным рецепторов сопровождается стимуляцией образования и высвобождения эндорфинов, динорфинов, пептидов, играющих важную роль в регуляции болевых ощущений, проницаемости сосудов и других процессов.

## **Показания**

Невралгии, миозиты, артралгии.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату. Экземы, воспалительные и инфекционные заболевания кожи, локализованные в области его применения, а также аллергические заболевания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении с препаратами, содержащими органические соединения, могут образовываться новые соединения, денатурация белковых компонентов.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

### **Особенности применения**

Предотвращать попадание препарата на слизистые оболочки и в глаза.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

### **Способ применения и дозы**

Спирт муравьиный применять наружно для растирания пораженного участка тела. Кратность применения препарата и длительность курса определяются характером и тяжестью заболевания.

### **Дети**

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

### **Передозировка**

Не наблюдалось.

### **Побочные реакции**

Возможны сильное раздражение кожи, сыпь, образование волдырей.

*В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!*

### **Срок годности**

3 года.

*Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.*

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 50 мл во флаконах.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

69063, Украина, г.. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).