

Состав

действующее вещество: кислота муравьиная;

100 мл препарата содержат кислоты муравьиной 1,4 г

вспомогательные вещества: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная жидкость со специфическим резким запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли.

Код АТХ M02A X10.

Фармакодинамика

Спирт муравьиный относится к средствам, которые раздражают чувствительные нервные окончания. Вследствие стимуляции рецепторов кожи и подкожных тканей препарат оказывает не только рефлекторное, но и общий гуморальный влияние. Раздражение спиртом муравьиным рецепторов сопровождается стимуляцией образования и высвобождения эндорфинов, динорфинов, пептидов, играющих важную роль в регуляции болевых ощущений, проницаемости сосудов и других процессов.

Показания

Невралгии, миозиты, артралгии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Экземы, воспалительные и инфекционные заболевания кожи, локализованные в области его применения, а также аллергические заболевания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами, содержащими органические соединения, могут образовываться новые соединения, денатурация белковых компонентов.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Спирт муравьиный применяют наружно для растирания пораженного участка тела. Кратность применения препарата и длительность курса определяются характером и тяжестью заболевания.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 12 лет.

Передозировка

Не наблюдалось.

Побочные реакции

Возможны сильное раздражение кожи, сыпь, образование волдырей.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл в флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).