

## **Состав**

*действующее вещество:* thiocolchicoside;

1 г крема содержит тиоколхикозиду 2,5 мг

*вспомогательные вещества:* полисорбат 80, ланолин кондитерский, спирт цетиловый, воска цетил эфиры, стеариновая кислота, метилпарабен (E 218), этилпарабен (E 214), натрия альгинат, натрия лаурилсульфат, эссенция липы, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Крем.

*Основные физико-химические свойства:* светло-желтый однородный крем.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной болях. Код АТХ M02A X10.

## **Фармакодинамика**

Тиоколхикозид является полусинтетическим миорелаксантом, получаемый из натурального гликозида колхикозида.

Тиоколхикозид связывается только с ГАМК и стрихнин-чувствительными глициновыми рецепторами. Тиоколхикозид действует как антагонист ГАМК-рецепторов. Его миорелаксирующее действие обусловлено комплексом механизмов на супраспинальном уровне. Не оказывает курареподобного действия.

## **Фармакокинетика**

После местного применения тиоколхикозида в рекомендуемых дозах для лечения болезненных контрактур мышц, его плазменные уровни были ниже минимального уровня определения. Это свидетельствует об отсутствии системной абсорбции.

## **Показания**

Симптоматическое лечение болезненных контрактур мышц:

- острый период пояснично-крестцового радикулита;
- шейно-плечевая невралгия;

- спастическая кривошея;
- посттравматическая боль;
- послеоперационная боль.

## **Противопоказания**

- Повышенная чувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата.
- Вялый паралич;
- гипотония мышц;
- беременность;
- кормления грудью.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Данных о каких-либо клинически значимых взаимодействиях с другими лекарственными средствами нет.

## **Особенности применения**

Длительное применение тиоколхикозида может вызвать развитие реакций сенсibilизации. В этом случае следует прекратить прием препарата и начать соответствующее лечение.

Препарат содержит метилпарабен (E 218) и этилпарабен (E 214) которые могут вызывать реакции гиперчувствительности замедленного (контактный дерматит) и немедленного (крапивница и бронхоспазм) типа.

Препарат содержит спирт цетиловый и ланолин кондитерский, которые могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Нет данных о влиянии тиоколхикозида на способность управлять автотранспортом или другими механизмами. В очень редких случаях возможно развитие сонливости, что следует учитывать при управлении автотранспортом или другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Данных по местному применению тиоколхикозида беременным нет. Препарат противопоказан в период беременности.

В случае необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

### **Способ применения и дозы**

Препарат предназначен для наружного применения взрослым.

Крем нанести на пораженный участок тела 2-3 раза в сутки и слегка втереть в кожу. В случае развития побочных реакций следует уменьшить дозу препарата (согласно рекомендации врача). Продолжительность применения препарата зависит от показаний и эффективности лечения.

### **Дети**

Данных по местному применению тиоколхикозида детям нет. Препарат не следует применять детям.

### **Передозировка**

Данных о случаях передозировки нет. Возможно усиление побочных реакций.

### **Побочные реакции**

В редких случаях возможно развитие реакций гиперчувствительности (контактный дерматит, крапивница, бронхоспазм, ангионевротический отек). В случае развития побочных реакций следует уменьшить дозу препарата (согласно рекомендации врача).

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 30 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

По рецепту.

**Производитель**

УОРЛД Медицина ИЛАЧ САН. ВЕ ТиДжей. А.Ш., Турция/WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC. A.S., Turkey.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

15 Теммуз Махаллеши Джами Йолу Джаддеси №50 Гюнешли Бешикташ/Стамбул, Турция/15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No: 50 Gunesli Bagcilar/Istanbul, Turkey.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).