

## **Состав**

*1 г линимента содержит действующие вещества:* сока листа алоэ древовидного свежего (*Aloe arborescens* Mill.) – 478 мг, экстракта жидкого (1:1) ромашки цветков (*Matricariae flos*) – 200 мг, экстракта жидкого (1:1) ноготков (календулы) цветков (*Calendulae flos*) – 100 мг, левоментола – 1 мг, эвкалиптового масла – 1 мг;

*вспомогательные вещества:* масло касторовое, эмульгатор № 1;

*вспомогательные вещества, входящие в состав сока листа алоэ древовидного свежего:* этанол (96%), хлорбутанол, гемигидрат; *в состав экстракта жидкого (1:1) ромашки цветков и экстракта жидкого (1:1) ноготков (календулы) цветков:* этанол (96%), вода очищенная.

*вспомогательные вещества, входящие в состав эмульгатора №1:* спирт цетиловый, спирт стеариловый

## **Лекарственная форма**

Линимент.

*Основные физико-химические свойства:* однородная густая масса от светло-коричневого до коричневого с зеленоватым оттенком цвета со специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, которые применяются местно при боли в суставах и мышцах.  
Код АТС M02A X10.

## **Фармакодинамика**

Алором – комбинированный препарат, оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффект, улучшает трофические процессы, связанные с комплексным влиянием физиологически активных веществ растений, входящих в его состав (флавоноиды, дубильные вещества, антрахиноины и т.п.). Препарат способствует репарации тканей, рассасыванию гематом.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

В составе комплексной терапии при лечении посттравматических артритов, плекситов, радикулитов, полиартритов, миозитов, тендовагинитов, наружных гематом, при миалгиях; для профилактики пролежней.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к растениям семейства сложноцветных. Беременность. Детский возраст до 6 лет.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не установлено.

### **Особенности применения**

Линимент нельзя наносить на открытые раны и поврежденную кожу. Для усиления терапевтического эффекта рекомендуется сухое согревающее закутывание болевых мест.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Неизвестна.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности или кормления грудью препарат не применяют.

### **Способ применения и дозы**

Применяют наружно взрослым и детям в возрасте старше 6 лет. Линимент наносят тонким слоем на кожу 2-3 раза в сутки, слегка массируя пораженные места. Площадь нанесения зависит от размера и локализации очага поражения. Курс лечения составляет от 5 до 15 дней. В случае необходимости курс лечения повторяют через 1-2 недели после консультации с врачом.

### **Дети**

Применение препарата детям в возрасте до 6 лет противопоказано.

### **Передозировка**

При передозировке возможно усиление побочного действия. Терапия – симптоматическая.

### **Побочные реакции**

В отдельных случаях возможны аллергические реакции в виде раздражения кожи, высыпаний, зуда, контактного дерматита.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 2 оС до 8оС. Не допускается замораживания.

Хранить в недоступном для детей месте.

После раскрытия тубы линимент хранить в течение курса лечения.

### **Упаковка**

По 30 г в тубах №1.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

АО «Лубныфарм».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).