

Состав

действующие вещества: ментол (левоментол), анисовое масло, настойка перца;

5 мл раствора содержат: ментола (левоментола) 1,0 мг анисового масла 0,0035 мл настойки перца 0,025 мл;

вспомогательные вещества: масло имбиря, масло гвоздичное, масло мяты перечной, глицерин, глюкозы раствор, сахароза, трагакант, бензойная кислота (E 210), карамель (E 150), настойка бензоина, толуанский бальзам, этанол 90%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для приема внутрь.

Основные физико-химические свойства: сироп темно-коричневого цвета с запахом этанола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, применяется при простудных заболеваниях дыхательных путей. Препарат проявляет муколитическое, бронхолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное, успокаивающее и потогенное действие.

Ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое, местноанестезирующее действие, способствует очищению дыхательных путей от слизи. Анисовое масло имеет отхаркивающие свойства, спазмолитическое и антибактериальное действие. Настойка перца оказывает отвлекающий эффект.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

Симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся болью в горле, кашлем, насморком и

воспалением слизистых оболочек.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие не описано.

Особенности применения

С осторожностью применять больным сахарным диабетом, так как препарат в своем составе содержит сахарозу, глюкозу. Не применять пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозы-сахарозы, сахарозы-изомальтозы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не оказывает снотворного эффекта, не влияет на способность управлять автотранспортом или работе с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью после оценки врачом соотношения польза/риск.

Способ применения и дозы

Применять внутрь.

Взрослым и детям старше 12 лет - по 2 чайные ложки (10 мл) каждый час или по 3 чайные ложки (15 мл) каждые 2-3 часа.

Детям 6-12 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) каждый час или по 2 чайные ложки (10 мл) каждые 2-3 часа.

Детям в возрасте 3-6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2:00.

Перед применением бутылочку встряхнуть.

Не применять более 6 доз в течение суток. Курс лечения составляет 14 дней.

Пациентам пожилого возраста назначать такие же дозы, что и для взрослых.

Дети

Противопоказан детям в возрасте до 3 лет.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Побочные реакции

У лиц с индивидуальной непереносимостью любого компонента препарата возможны желудочно-кишечные расстройства, реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

По 100 мл в бутылке; по 1 бутылке в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Белл Санз & Компани (Драггистс) Лимитед.
Bell Sons & Company (Druggists) Limited.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Гиффорд Хаус, Слейдберн Кресцент, Саутпорт, PR9 9AL, Великобритания.
Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, PR9 9AL, United Kingdom.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).