

Состав

Лиственницы арабиногапактан, исландский мох, мед, сироп фруктозы, концентрат яблочного сока, подорожника экстракт, алтея экстракт, апельсиновый ароматизатор, камедь карани, эфирное масло сладкого апельсина, карамель.

Описание

Определение, состав и назначение

Благодаря уникальному комплексу полисахаридов, которые содержится в растительных экстрактах, средство Афлубин® Плюс сироп от кашля способен успокоить кашель, облегчить раздражение и способствует отхождению избытка мокроты. Афлубин® Плюс сироп от кашля успокаивает сухой и продуктивный кашель, он также полезен в качестве адъюванта для защиты дыхательных путей, поскольку создает мукоадгезивный барьер, способный ограничивать контакт с раздражителями и патогенными микроорганизмами.

Механизм действия

Боль в горле, кашель и другие острые заболевания верхних и нижних дыхательных путей очень распространены, часто вызванные патогенными микроорганизмами или воздействием вредных раздражителей, в том числе из окружающей среды, и низкими температурами.

Афлубин® Плюс сироп от кашля содержит растительные экстракты для защиты слизистой оболочки, облегчения кашля и действует как отхаркивающее средство. Полисахариды, содержащиеся в растительных экстрактах средства Афлубин Плюс сироп от кашля, образуют мукоадгезивный гель, оказывает защитное действие и создает барьер, способный ограничивать контакт с внешними раздражителями и патогенными микроорганизмами. Из-за их сходства с водой, полисахариды способствуют увлажнению слизистой оболочки и разжижению слизи. Кроме того, успокаивающие экстракты облегчают сухой и продуктивный кашель.

Сироп содержит мед, который придает ему приятный вкус.

Способ применения и дозы

Дети в возрасте от 3 до 6 лет: 5 мл 2 раза в день.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет: 5 мл 4 раза в день.

Дети старше 12 лет и взрослые: 10 мл 4 раза в день.

Тщательно взболтать перед употреблением. Плотно закрыть флакон после использования. Перед применением желательно проконсультироваться с врачом.

Побочные реакции

При дозах, необходимых для достижения терапевтического эффекта, никогда не сообщалось о возникновении побочных реакций. Единственными известными противопоказаниями являются случаи индивидуальной аллергии/гиперчувствительности к компонентам веществ. Не следует использовать в случае известной аллергии на продукты пчеловодства.

Взаимодействие с биологически активными добавками и лекарствами

Никаких взаимодействий компонентов Афлубин Плюс сироп от кашля, в рекомендуемых дозах, с пищевыми добавками или лекарственными средствами не выявлено.

Однако, как правило, Афлубин Плюс сироп от кашля рекомендуется принимать за 2 часа до или после применения лекарств или пищевых добавок.

Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом лечения.

Условия хранения

Храните Афлубин Плюс сироп от кашля в сухом месте вдали от прямых источников тепла или света. Храните в недоступном для детей месте. Храните при температуре от 8 ° до 25 ° C. Плотно закрывайте флакон после использования.

Предостережения и меры предосторожности

Не применять средство детям в возрасте до 3 лет, применение средства возможно только по рекомендации врача.

Использовать средство в течение 2 месяцев после первого вскрытия флакона.

После курса лечения рекомендуется не принимать Афлубин Плюс сироп от кашля не менее 7 дней.

Не принимать в случае непереносимости средства.

Не принимать в случае известной гиперчувствительности к компонентам медицинского изделия.

Не использовать препарат более 30 дней если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте.

Дата окончания срока годности

Не принимать по истечению срока годности, указанного на упаковке. Дата окончания срока годности касается средства при условии его хранения в неповрежденной таре.

Утилизация

Средство с истекшим сроком годности должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации отходов местного органа. В любом случае не выбрасывайте средство или его упаковку в окружающую среду.