Состав

- Коллаген морской рыбий - не менее 4500 мг.
- Хондроитина сульфата - 200 мг.
- Глюкозамина гидрохлорид - 250 мг.
- Стеарат магния.
- Диоксид кремния.

Лекарственная форма

Коллаген - основной компонент соединительной ткани и самый распространенный белок, составляющий от 25% до 35% белков во всем теле. Старение кожи во многом зависит от уменьшения синтеза коллагена в организме. Результат этого процесса мы видим не только в виде морщин, потери упругости и эластичности. Ухудшается состояние волос, ногтей, мышц, появляются боли в суставах, снижается эластичность сосудов, образуется целлюлит. Доказаны положительные эффекты коллагена: укрепление хряща, укрепление связок и костей. Улучшение питания мышц (аминокислоты идут на строительство мышечной ткани, а относительно большое содержание аргинина способствует улучшению кровотока в мышцах).

Ежедневный прием коллагена восстанавливает подвижность суставов, снижает суставные боли, препятствует развитию остеопороза. При остеоартрите и остеопорозе, коллаген рекомендуется принимать в течение более длительного времени.

Глюкозамина гидрохлорид стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие. Способствует восстановлению хрящевых поверхностей и уменьшению дегенеративных изменений в суставах. Улучшает подвижность суставов, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли. Увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща.

Хондроитина сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, подавляет ферменты, нарушающие структуру и функции суставного хряща, тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Замедляет резорбцию костной ткани, снижает потерю кальция и ускоряет процессы репарации костной ткани, тормозит прогрессирование остеоартроза.

Фармакокинетика

Улучшение суставов.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка:

- взрослым - 1-2 пакетика в день;
- детям старше 12-ти лет - по 0,5-1 пакетику в день во время еды, растворив порошок в полстакана воды (сока).

Курс приема - 30 дней.

При остеоартрите и остеопорозе коллаген рекомендуется принимать в течение более длительного времени, около 5-10 г в день не менее 3-х месяцев.

Содержимое пакета предварительно растворить в 0,5 стакана воды, сока.

Растворимость происходит лучше и более быстрее в теплой жидкости.

Упаковка

14 саше в картонной коробке.

Производитель

ООО "Фелицата", Украина