

## **Состав**

*действующее вещество:* сухой экстракт листьев плюща обыкновенного;

1 капсула содержит 52,5 мг плюща обычных листьев экстракта сухого (*Hederae heliсis e folium*) ((4-8):1) (экстрагент этанол 30%);

*другие составляющие:* целлюлоза микрокристаллическая, мальтодекстрин, крахмал кукурузный, коповедон, магния стеарат;

состав оболочки капсулы: желатин, диоксид титана (E 171), железа оксид желтый (E 172), индиготин (E 132).

## **Лекарственная форма**

Капсулы.

*Основные физико-химические свойства:* жесткие желатиновые капсулы № 3, корпус капсулы и крышечка – темно-зеленого цвета. Содержимое капсулы – порошок светло-коричневого цвета, содержащий небольшие дольки от светлого до более темного цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ R05C A.

## **Фармакодинамика**

Лекарственное средство растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антимикробное действие, обусловленное наличием гликозидов (сапонинов).

Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем; симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к активному веществу, растениям семейства Аралиевых или к любому другому компоненту препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При одновременном применении Пектолван плющ и других лекарственных средств побочного действия препарата не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например антибиотиками.

### **Особенности применения**

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Одновременное применение противокашлевых лекарственных средств, содержащих кодеин или дексметорфан, не рекомендуется без консультации врача.

Осторожно применять препарат пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) менее 100 мг/дозу.

Суточная доза капсул Пектолван Плющ (3 капсулы) содержит 0,00675 ХО, что нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям от 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях продолжительность лечения составляет 1 нед. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжать терапию в течение 2-3 суток после улучшения состояния пациента.

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу для дальнейшего лечения.

### **Дети**

Препарат можно применять детям от 12 лет.

### **Передозировка**

Прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать тошноту, рвоту, диарею или агитацию. Лечение симптоматическое.

### **Побочные реакции**

Могут наблюдаться аллергические реакции: одышка, отек слизистых, высыпания на коже, крапивница, зуд.

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 10 капсул в блистере. По 3 блистера в пачке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

АО «Фармак».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).