

Состав

действующие вещества: 100 мл препарата содержит: Crataegus D1 20 мл, Arnica D6 10 мл, Kalium carbonicum D6 10 мл, Digitalis D12 10 мл, Convallaria D12 10 мл

вспомогательные вещества: этанол 43% (м / м). 1 мл раствора содержит 25 капель.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная от желтоватого до красновато-желтого цвета жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат проявляет антиангинальные, метаболические, кардиотонические и антигипертензивные эффекты. Уменьшает адренергическую иннервацию, оказывает антиаритмическое, мягкое диуретическое, антиоксидантное и кардиопротекторное действие. Улучшает показатели липидного обмена (уровень холестерина, β-липопротеидов). Влияет на реологические свойства крови, способствует снижению коагуляционных свойств плазмы и нормализации уровня фибриногена и протромбинового индекса. Препарат нормализует кровообращение, обменные процессы и питание сердечной мышцы, сократительную и насосную функции миокарда, способствует нормализации повышенного артериального давления, укрепляет стенки сосудов и оказывает антисклеротическое действие.

В комплексном лечении Пумпан® снижает частоту и интенсивность приступов стенокардии, предотвращает дальнейшее развитие и обострения болезней сердца. Благодаря комплексному действию включения Пумпану® в базовую

сердечно-сосудистую терапию позволяет сократить прием или дозы других сердечно-сосудистых препаратов (нитратов, β-блокаторов, антагонистов кальция). У пациентов с нестабильной стенокардией, в том числе рефрактерной к базисной терапии, включение Пумпану® в комплексное лечение способствует стабилизации состояния больного.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

- Нейроциркуляторная дистония;
- в комплексном лечении хронической ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, дистрофических изменений миокарда, нарушений сердечного ритма, сердечной недостаточности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам, к растениям семейства сложноцветных (таких как ромашка, календула, хризантема) или к вспомогательному веществу препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В настоящее время нет информации относительно взаимодействия с другими лекарственными средствами.

При одновременном применении Пумпан® с другими сердечно-сосудистыми лекарственными средствами прием или доза препаратов базисной терапии может быть уменьшена, но только под наблюдением врача. Рекомендуется придерживаться 20-минутного перерыва между приемом лекарственных средств.

Нездоровый образ жизни, употребление стимуляторов, неправильное питание могут негативно влиять на эффективность гомеопатических лекарственных средств.

Особенности применения

При аритмиях не следует принимать препарат без консультации с врачом, поскольку Пумпан может уменьшать эктопическую активность сердца (суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолы), а у некоторых пациентов иногда могут отмечаться увеличение суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол.

Пумпан капли оральные не следует применять пациентам с алкогольной зависимостью, поскольку в одной дозе содержится 160 мг спирта.

Содержание спирта следует учитывать также при применении препарата беременным, кормящим грудью, детям и пациентам с высоким риском заболеваний печени и риском приступов эпилепсии.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно не является вредной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применения препарата необходимо прекратить.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Поскольку Пумпан содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса, прозрачности или цвета раствора, не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет или имеет совсем незначительное влияние на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данные по применению лекарственного средства *в период беременности и кормления грудью* отсутствуют. Доказательств любого риска приема препарата в период беременности и кормления грудью нет, поэтому рекомендуется применять препарат в этот период с осторожностью, только в случаях, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Способ применения и дозы

Взрослые (все терапевтические показания), дети старше 12 лет (только нейроциркуляторная дистония): 10 капель препарата, разведенного в небольшом количестве воды.

В начале лечения, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, рекомендован прием препарата каждые полчаса-час до 8 раз в сутки до улучшения состояния, но не более 3-х суток. После улучшения состояния частота приема должна быть уменьшена до 2-3 раз в сутки.

Для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать Пумпан в промежутках между приемами пищи (за 30 минут до или через 1 час после еды), подержав некоторое время во рту перед проглатыванием.

Продолжительность курса лечения - 2-3 месяца. При стабилизации состояния возможен переход на 1-2 разовый поддерживающий прием.

Дети

Применение препарата Пумпан® капли оральные детям до 12 лет не рекомендуется из-за недостатка данных.

Применение препарата Пумпан® капли оральные детям старше 12 лет не рекомендуется при таких терапевтических показаниях как сердечная недостаточность, артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца из-за недостатка данных.

Передозировка

Случаев передозировки не было зарегистрировано.

Побочные реакции

В редких случаях у лиц с гиперчувствительностью на любой компонент препарата возможно возникновение аллергических реакций.

Наблюдалось повышение фаз тахикардии и очень редко, в основном в ночное время, повышение фаз брадикардии. Недостаточно данных для вывода о частоте возникновения побочных реакций.

Срок годности

5 лет. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Лекарственное средство хранить в плотно закрытом флаконе в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл или по 50 мл, или по 100 мл во флаконах-капельницах из темного стекла, в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Рихард Биттнер АГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оссиахерштрассе 7, A-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины.](#)