

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Crataegus D1 74,8 мг, Arnica D6 37,2 мг, Kalium carbonicum D6 37,2 мг, Digitalis D12 37,2 мг, Convallaria D12 37,2 мг;

вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки белого цвета с едва оранжевым оттенком, с возможными вкраплениями, с распределительной чертой.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство улучшает кровообращение, обменные процессы и питание сердечной мышцы, повышает эффективность и экономичность работы сердца, способствует улучшению сократительной и насосной функции миокарда. Улучшает показатели липидного обмена без дополнительного применения гиполипидемических препаратов. Способствует нормализации повышенного артериального давления, укрепляет стенки сосудов и оказывает антисклеротическое, противоаритмическое действие. Улучшает реологические свойства крови.

В комплексном лечении Пумпан® снижает частоту и интенсивность приступов стенокардии, укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает устойчивость сердца к физической и психоэмоциональной нагрузке, предотвращает дальнейшее развитие и обострение болезни сердца. Уменьшает потребность и позволяет сократить прием или дозы других сердечно-сосудистых препаратов.

Улучшает качество жизни и адаптационные возможности лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Показания

- Применять в комплексном лечении хронической ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности.
Нейроциркуляторная дистония.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам, к растениям семейства сложноцветных (таких как ромашка, календула, хризантема) или к вспомогательному веществу препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клинически значимое взаимодействие препарата Пумпан® с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.

При одновременном применении Пумпан® с другими сердечно-сосудистыми лекарственными средствами дозу препаратов базисной терапии можно уменьшить, но только под наблюдением врача.

Особенности применения

Таблетки Пумпан® обычно уменьшают суправентрикулярной и желудочковая экстрасистолы, но нельзя исключить возможность повышения суправентрикулярной и желудочковой экстрасистол в отдельных пациентов.

1 таблетка содержит 225,9 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

В начале лечения могут кратковременно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Поскольку Пумпан® содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.

Применение в период беременности или кормления грудью

До сих пор не получено доказательств наличия особого риска применения препарата в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять с осторожностью в период беременности и кормления грудью в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода / ребенка. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Способ применения и дозы

Взрослые (все терапевтические показания), дети старше 12 лет (только нейроциркуляторная дистония): по 1 таблетке 2 раза в сутки.

В начале лечения, а также в случаях, когда требуется быстрое ослабление симптомов, рекомендован прием препарата по 1 таблетке 4 раза в сутки. После улучшения состояния доза должна быть снижена до 1 таблетки 2 раза в сутки.

При стабилизации состояния возможен переход на однократный прием (поддерживающая доза).

Для достижения максимального эффекта препарат Пумпан® рекомендуется принимать в промежутках между приемами пищи (за 30 минут до или через 1 час после еды). Таблетку рекомендуется держать во рту до полного растворения.

Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и определяется врачом.

Дети

Применяется детям старше 12 лет по показаниям нейроциркуляторной дистонии. По другим показаниям не применяется детям (в возрасте до 18 лет).

Передозировка

Случаев передозировки не было зарегистрировано.

Побочные реакции

В исключительных случаях у лиц с повышенной чувствительностью к какому-либо из компонентов препарата возможны аллергические реакции. Может наблюдаться повышение фаз тахикардии и очень редко, в основном в ночное время, повышение фаз брадикардии. Частота возникновения побочных реакций не установлена.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 12 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 3, или 4 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Рихард Биттнер АГ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).