Состав

действующие вещества:

1,1 мл раствора содержат: Sulfur D4 - 3,3 мкл, Sulfur D10 - 3,3 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D6 - 6,6 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D10 - 6,6 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D30 - 6,6 мкл;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает иммунокорректирующее (косвенно противовирусное), противовоспалительное, дезинтоксикационное действие, регенерирует SH-группы ферментов при интоксикациях, за счет активации защитных сил организма и нормализации его функций.

Фармакокинетика

Для гомеопатических препаратов не определяется.

Показания

Острые и хронические инфекционные заболевания вирусного происхождения (гепатит, цитомегаловирусная инфекция, герпес, бронхит, пневмония, коклюш, грипп, ОРВИ).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Если симптомы не исчезают или состояние ухудшается, необходимо проконсультироваться с врачом.

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) / дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Случаи негативного влияния неизвестны. Возможность применения определяет врач в случае, если польза от применения лекарственного средства превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет - 1 ампула по 1,1 мл. Применять 1-3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных (струйно) инъекций.

В острых случаях - 1 ампула ежедневно в течение 3-5 дней.

Курс лечения 2-5 недель.

Продолжительность лечения зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 6 лет.

Передозировка

Не отмечалась.

Побочные реакции

В редких случаях могут возникать кожная сыпь, зуд, крапивница, эритема, сухость кожи. В таком случае необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Также возможны аллергические реакции, ангионевротический отек, изменения в месте введения, в том числе покраснение, отеки.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 (5 × 1), 10 (5 × 2) или 100 (5 × 20) ампул по 1,1 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).