

Состав

действующие вещества: 1,1 мл раствора содержат: Acidum formicicum D10 – 1,1 мг, Acidum formicicum D30 – 1,1 мг, Acidum formicicum D200 – 1,1 мг, Asclepias tuberosa D10 – 1,1 мг, Asclepias tuberosa 1,1 мг, Asclepias tuberosa D200 – 1,1 мг, Castoreum D10 – 1,1 мг, Castoreum D30 – 1,1 мг, Castoreum D200 – 1,1 мг, Crataegus D10 – 1,1 мг, Crataegus D30 – 1,1 мг, Crataegus D200 – 1,1 мг, Nitroglycerinum D10 – 2,2 мг, Nitroglycerinum D30 – 2,2 мг, Nitroglycerinum D200 – 2,2 мг, Plumbum jodatum D200 – 1,1 мг, Selenicereus grandiflorus D10 – 1,1 мг, Selenicereus grandiflorus D30 – 1,1 мг, anthelmia D30 – 2,2 мг, Spigelia anthelmia D200 – 2,2 мг;

другие составляющие: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачный бесцветный раствор без запаха и практически свободный от частиц.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат оптимизирует состояние вегетативной нервной системы, устраняет спазм коронарных сосудов, оказывает нитратоподобное, кардио- и вазопротекторное действие. Действие препарата основывается на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет входящих в состав препарата веществ растительного, минерального и животного происхождения.

Показания

В составе комплексной терапии ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, постинфекционного миокардита; нейроциркуляторная дистония.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат совместим с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Не использовать при заболеваниях щитовидной железы без предварительной консультации врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия не известны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально з урахуванням користі/ризиків.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям от 12 лет - 1,1 мл, детям от 2 до 3 лет - 0,3 мл, детям от 3 до 6 лет - 0,6 мл, детям от 6 до 12 лет - 0,7мл. Применять разовую возрастную дозу 1 раз в сутки в течение 2-3 суток, затем 1-3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций, а также в акупунктурные точки. При тяжелых состояниях разовую возрастную дозу применять до 3 раз в сутки в течение первых 2-3 дней лечения, а затем - 1-3 раза в неделю.

С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и способ применения.

Курс лечения - 2-5 недель.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям от 2 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

Реакции гиперчувствительности.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Несовместимость. Неизвестная.

Упаковка

5 ампул по 1,1 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биология Хайльмиттель Хеэль ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).