

## **Состав**

*действующие вещества:* 2,2 мл раствора содержит: Acidum cis-aconicum D10 – 22 мг, Apisinum D8 – 22 мг, Aquilegia vulgaris D4 – 22 мг, Calvatia gigantea D6 – 22 мг, Cypripedium parviflorum var. pubescens D6 – 22 мг, Hydrastis canadensis D4 – 22 мг, Hypophysis suis D13 – 22 мг, Kreosotum D8 – 22 мг, Lachesis D10 – 22 мг, Lilium lancifolium D4 – 22 мг, Magnesium phosphoricum D10 – 22 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D10 – 22 мг, Ovarium suis D8 – 22 мг, Placenta totalis suis D10 – 22 мг, Psychotria ipecacuanha D6 – 22 мг, Pulsatilla pratensis D18 – 22 мг, Sepia officinalis D10 – 22 мг, Tuba uterina suis D10 – 22 мг, Uterus suis D10 – 22 мг;

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

## **Лекарственная форма**

Раствор для инъекций.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакологические свойства**

Лекарственное средство регулирует уровень женских половых гормонов, оказывает метаболическое, седативное и противовоспалительное действие. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в его состав.

## **Показания**

Дисменорея, эндометрит, метрит, параметрит, климакс, недостаточность функции передней доли гипофиза (гипопитуитаризм), крауроз вульвы, мастопатия, остеомалация, меноррагия, различные нарушения метаболизма, связанные со снижением синтеза женских половых гормонов, включая

гериатрические.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

### **Особенности применения**

В редких случаях возможно гомеопатическое первоначальное обострение заболеваний, быстро проходит и не требует отмены препарата.

При содержании симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Неизвестна.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решается индивидуально с учетом соотношения пользы для матери и риска для плода (ребенка).

### **Способ применения и дозы**

Разовая доза: взрослым и девушкам пубертатного возраста - 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, а в случае необходимости - внутривенных инъекций 1-2 раза в неделю.

В зависимости от особенностей течения заболевания и состояния больного врач может изменять продолжительность курса лечения и способ применения.

Курс лечения - 4-6 недель.

### **Дети**

Лекарственное средство рекомендовано для применения девушкам пубертатного возраста.

### **Передозировка**

Не отмечалась.

### **Побочные реакции**

Аллергические реакции. Возможно усиление слюноотделения - в таком случае рекомендуется уменьшить дозу препарата или прекратить.

### **Срок годности**

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Упаковка**

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

По рецепту.

### **Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ / Biologische Heilmittel Heel GmbH.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/ Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).