

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат: Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг, Bryonia alba 200CH 20 мг, Causticum 1000CH 20 мг, Ledum 200CH 20 мг, Rhododendron 50CH 20 мг;

вспомогательное вещество: сахар кондитерский.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы, растворимые в воде, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Облегчает боль, отечность, скованность движений в суставах, способствует нормализации минерального обмена, улучшает кровоснабжение тканей.

Показания

В комплексном лечении: боли в суставах, артриты, артрозы, ревматоидный полиартрит, подагра. Растяжение мышц и связок. Корешковые боли, пояснично-крестцовый радикулит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Возможно совместное применение с любыми методами лечения и лекарственными средствами (в том числе антибиотиками, противовоспалительными средствами, витаминами). Интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.

Особенности применения

Пациентам с редкой врожденной непереносимостью фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует применять это лекарственное средство.

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – сахара кондитерского – проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение лекарственного средства в период беременности и кормления грудью не исследовалось. Вопрос о целесообразности применения лекарственного средства беременным и кормящим грудью, врач решает индивидуально.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте от 12 лет – по 5 гранул под язык до полного рассасывания; детям в возрасте от 3 до 12 лет – по 3 гранулы на 1 прием, растворенные в небольшом количестве воды или под язык. Гранулы следует принимать за 15–20 минут до или через 1 час после еды.

Принимать 1-3 раза в сутки в зависимости от интенсивности болевого синдрома.

При уменьшении болей лекарственное средство принимать 2–3 раза в неделю. Курс лечения – 3–4 месяца. При необходимости курс повторить через 2-3 недели.

Дети

Не назначают детям до 3 лет.

Передозировка

В большинстве случаев не приводит к негативным последствиям и не требует антидотной терапии, но у лиц с гиперчувствительностью к компонентам лекарственного средства возможно усиление проявлений побочных реакций.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале; по 1 пеналу в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).