

Состав

действующие вещества: 100 г капле содержат:

- Agnus Castus Ø (прутняк обычный) 20 г;
- Caulophyllum thalictroides D4 (стеблелист василисникopodobный) 10 г;
- Cyclamen europaeum D4 (фиалка альпийская) 10 г;
- Strychnos Ignatia D6 (грудошник горький) 10 г;
- Iris versicolor D2 (петушок разноцветный) 20 г;
- Lilium tigrinum D3 (лилия тигровая) 10 г.

вспомогательные вещества: этанол 53% (об / об).

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная или слегка мутная жидкость светло-желтого цвета с ароматным запахом. В процессе хранения возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство для применения в гинекологической практике.

Под влиянием компонентов препарата происходит снижение концентрации пролактина в крови и проявляется нормализующее действие на баланс половых гормонов.

Показания

В комплексном лечении предменструального синдрома: психическая лабильность, головная боль или мигрень, отеки, запоры, мастодиния (нагрубание и болезненность молочных желез), также жалобы во время менструации, нарушения менструального цикла и фиброзно-кистозная мастопатия.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не исключено взаимодействие с допамин агонистами, допамин антагонистами, эстрогенами и анти-эстрогенами из-за возможных дофаминергических и эстрогенных эффектов прутняка обычного.

Общие замечания.

Вообще на эффективность гомеопатических препаратов могут негативно влиять пагубные факторы образа жизни, потребление возбуждающих и раздражающих средств.

В случае приема других препаратов следует обратиться за консультацией к врачу.

Особенности применения

Пациентам, которые проходят или прошли курс лечения эстрогензависимых опухолей, не рекомендуется применять без консультации врача препараты, в составе которых есть прутняк обыкновенный (*Agnus Castus*).

Пациентам, принимающим допамин агонисты, допамин антагонисты, эстрогены и анти-эстрогены, необходимо проконсультироваться с врачом перед применением препарата Мастодинон® капли оральные.

Если симптомы ухудшаются при применении лекарственного средства, следует обратиться за консультацией к врачу.

Пациентам с гипофизарными расстройствами в анамнезе следует проконсультироваться с врачом перед применением лекарственных средств, в составе которых есть прутняк обычный.

В случае пролактин-секретирующих опухолей гипофиза применения плодов прутняка обычного может маскировать симптомы опухоли.

Это лекарственное средство содержит 53% (об/об) этанола. Этанол может быть вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Это также следует принять во внимание при применении препарата группам высокого риска, таким как пациенты с заболеваниями печени или эпилепсии.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Особых предостережений не требуется, но следует учитывать, что препарат содержит этанол. В случае возникновения головокружения следует воздержаться от управления автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью. Экстракт плодов прутняка обычного может влиять на лактацию, а также на женскую фертильность путем регулирования менструального цикла.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, препарат принимать по 30 капель 2 раза в сутки (утром и вечером), разводя небольшим количеством воды. Капли можно принимать одновременно с другими жидкостями. Перед применением следует взболтать. Флакон при накапывании препарата следует держать вертикально.

Если симптомы не проходят или ухудшаются при применении лекарственного средства, следует обратиться за консультацией к врачу.

В процессе хранения возможно выпадение осадка, не влияет на эффективность препарата.

Дети

Из-за недостаточности данных препарат не рекомендуется применять детям и подросткам до 18 лет.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки нет.

Лечение передозировки: при возникновении проявлений передозировки необходима симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Наблюдались аллергические реакции, включая отек лица, одышку и затрудненное глотание. Возможны аллергические кожные реакции (включая сыпь, зуд, крапивница), головная боль, головокружение, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, боль в желудке), акне, а также нарушения менструального цикла.

Применение гомеопатических лекарственных средств может привести к временному ухудшению уже существующих симптомов (первоначальное обострения).

В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

После вскрытия флакона препарат годен к применению в течение 6 месяцев. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить для защиты от света в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконе, помещенном в картонную коробку.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Бионорика CE/Bionorica SE

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, г. Ноймаркт,
Германия/Kerscheneinerstrasse, 11-15, 92318 Neumarkt, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).