

## **Состав**

*действующие вещества:* ртути хлорид С6 (*hydrargyri dichloridum C6*), цистеин С6 (*cysteinum C6*);

1 г гранул содержит ртути хлорида С6 (*hydrargyri dichloridum C6*) 270 мкг, цистеина С6 (*cysteinum C6*) 240 мкг;

*вспомогательные вещества:* сахарная крупка.

## **Лекарственная форма**

Гранулы.

*Основные физико-химические свойства:* гранулы однородные по окраске, шарообразной формы, белого цвета с кремовым или сероватым оттенком.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Препарат обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими, дезинтоксикационными свойствами. Способствует активации защитных сил организма, повышает работоспособность и общую неспецифическую резистентность (сопротивляемость к заболеваниям). Нормализует факторы противоопухолевой (TNF $\alpha$ ), противовирусной, противопаразитарной (sIgA) защиты. При заболевании хроническим бактериальным простатитом улучшает мочеиспускание, уменьшает боль, повышает качество жизни и сексуальные возможности.

## **Показания**

В комплексной терапии воспалительных процессов при заболеваниях органов дыхания (ангина, ларингит, бронхит, пневмония), мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, аднексит), желудочно-кишечного тракта (гастрит,

энтероколит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), эндокринной системы (тиреоидит), опорно-двигательного аппарата (артрит, ревматизм, миозит, болезнь Бехтерева), при лимфаденитах.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не обнаружено.

### **Особенности применения**

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что препарат содержит сахар.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Данные по применению Меркурид в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

### **Способ применения и дозы**

Препарат применяют сублингвально. Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания, при необходимости гранулы можно растворить в небольшом количестве воды.

Взрослым рекомендуется принимать по 7 гранул 3 раза в сутки; детям старше 6 лет - по 3 гранулы 3 раза в сутки.

В острых случаях в течение первых 2 часов принимать разовую дозу каждые 15 минут до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в сутки. принимать по 15-20 минут до еды или через 1 час после еды.

Курс лечения - 3-4 недели.

Для достижения устойчивого результата рекомендуется повторение курса лечения с интервалом 2 недели.

### **Дети**

Не назначать детям до 6 лет.

### **Передозировка**

Случаев передозировки не выявлено. В случае появления неприятных симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

### **Побочные реакции**

У больных с повышенной чувствительностью к любым компонентам препарата возможно развитие реакций гиперчувствительности.

### **Срок годности**

3 года.

*Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.*

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 10 г, по 15 г, по 20 г или по 30 г в баночках или контейнерах.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ПАО «Биолик».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).