

Состав

действующие вещества: меркуриус корозивус С6 (*hydrargyri dichloridum C6*), цистеин С6 (*cysteinum C6*);

1 г гранул содержит меркуриуса корозивуса С6 (*hydrargyri dichloridum C6*) 270 мкг, цистеина С6 (*cysteinum C6*) 240 мкг;

вспомогательные вещества: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по окраске, шарообразной формы, белого цвета с кремовым или сероватым оттенком.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат обладает противовоспалительными, иммуномодулирующими, дезинтоксикационными свойствами. Способствует активации защитных сил организма, повышает работоспособность и общую неспецифическую резистентность (сопротивляемость к заболеваниям). Нормализует факторы противоопухолевой (TNF α), противовирусной, противопаразитарной (sIgA) защиты. При заболевании хроническим бактериальным простатитом улучшает мочеиспускание, уменьшает боль, повышает качество жизни и сексуальные возможности.

Показания

В комплексной терапии воспалительных процессов при заболеваниях органов дыхания (ангина, ларингит, бронхит, пневмония), мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, аднексит), желудочно-кишечного тракта (гастрит,

энтероколит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), эндокринной системы (тиреоидит), опорно-двигательного аппарата (артрит, ревматизм, миозит, болезнь Бехтерева), при лимфаденитах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не обнаружено.

Особенности применения

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что препарат содержит сахар.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данные по применению Меркурид в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

Способ применения и дозы

Препарат применяют сублингвально. Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания, при необходимости гранулы можно растворить в небольшом количестве воды.

Взрослым рекомендуется принимать по 7 гранул 3 раза в сутки; детям старше 6 лет - по 3 гранулы 3 раза в сутки.

В острых случаях в течение первых 2 часов принимать разовую дозу каждые 15 минут до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в сутки. принимать по 15-20 минут до еды или через 1 час после еды.

Курс лечения - 3-4 недели.

Для достижения устойчивого результата рекомендуется повторение курса лечения с интервалом 2 недели.

Дети

Не назначать детям до 6 лет.

Передозировка

Случаев передозировки не выявлено. В случае появления неприятных симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Побочные реакции

У больных с повышенной чувствительностью к любым компонентам препарата возможно развитие реакций гиперчувствительности.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 г, по 15 г, по 20 г или по 30 г в баночках или контейнерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Биолик».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131, Ш.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).