

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 таблетка содержит антитела к эндотелиальной NO синтазы аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений C12, C30 и C200 - 3 мг;

*вспомогательные вещества:* лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* таблетки плоскоцилиндрической формы, с насечкой и фаской, от белого до почти белого цвета. На одной плоской стороне нанесено черту, на другой плоской стороне нанесена надпись IMPAZA.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Повышает активность эндотелиальной NO синтазы, восстанавливает выработку эндотелием оксида азота (NO) при сексуальной стимуляции, повышает содержание в гладких мышцах циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) и способствует их расслаблению, что приводит к повышению кровенаполнения пещеристых тел, и обеспечивает достаточную по силе и продолжительностью эрекцию.

Препарат повышает либидо (половое влечение) и удовлетворения половым актом.

Регулярный прием препарата способствует повышению содержания тестостерона в сыворотке крови (при умеренно сниженном исходном уровне).

## **Показания**

Нарушение эрекции (эректильная дисфункция) различного происхождения.

Вегетативные расстройства климактерического периода у мужчин (слабость, утомляемость, снижение физической активности, снижение либидо).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрированы. Возможно применение препарата на фоне приема органических нитратов больным с ишемической болезнью сердца (стенокардией напряжения I-II функционального класса), и применение совместно с бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами АПФ (АПФ), антагонистами кальция.

## **Особенности применения**

В состав препарата входит лактоза, поэтому пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы и врожденной лактазной недостаточностью нельзя применять препарат.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не оказывает седативного действия, поэтому не влияет на скорость реакции.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применять взрослым мужчинам.

## **Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь. Не использовать вместе с пищей. Применять по 1 таблетке на прием. Таблетку держать во рту (желательно не разжевывая и не глотать) до полного растворения.

### Варианты применения

1. Регулярный прием. Для стабилизации половой потенции (способности к половому акту) рекомендован лечебно-профилактический курс длительностью не менее 12 недель. В зависимости от выраженности эректильной дисфункции частота приема может варьировать от 1 таблетки через день до двух приемов по 1 таблетке ежедневно, желательно в

вечернее время.

В случае необходимости курсовую терапию можно повторить через 3-6 месяцев.

2. Периодический прием. Для эпизодического стимулирования эрекции препарат принимать перед половым актом по 2 таблетки за 1-2 часа до ожидаемой близости.

## **Дети**

Препарат не применять детям.

## **Передозировка**

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные компонентами, входящими в состав препарата.

## **Побочные реакции**

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

## **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 20 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО Сантоника.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Ул. Вейвер 134Б, г. Каунас, Каунасское м. Один., LT-46353, Литва.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).