

## **Состав**

*действующие вещества:* 2,2 мл раствора содержат: Argentum nitricum D12 - 22 мг, Carbo vegetabilis D10 - 22 мг, Ceanothus americanus D6 - 22 мг, Iodum D8 - 22 мг, Lachesis D10 - 22 мг, Lycopodium clavatum D6 - 22 мг, Mandragora e radice siccata D8 - 22 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 - 22 мг, Momordica balsamina D6 - 22 мг, Podophyllum peltatum D6 - 22 мг, Veratrum album D4 - 22 мг;

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

## **Лекарственная форма**

Раствор для инъекций.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость без запаха и практически свободен от частиц.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Препарат оказывает противовоспалительное, спазмолитическое и антиэкссудативное действие на поджелудочную железу и благодаря этому восстанавливает ее функциональную активность. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

## **Показания**

Заболевания и нарушения функции поджелудочной железы, эпигастральной синдром, регулирования антигомтоксической эффекта при панкреатите.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не применять при болезнях щитовидной железы без консультации врача.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Совместим с другими лекарственными средствами.

## **Особенности применения**

При содержании симптомов или ухудшении состояния, необходимо проконсультироваться с врачом.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Токсичность гомеопатически разведенных веществ, входящих в состав лекарственного средства, при применении в период беременности и кормления грудью не установлена.

Никаких побочных эффектов не выявлено.

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решает врач индивидуально с учетом польза/риск.

## **Способ применения и дозы**

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 2,2 мл, детям от 1 до 3 лет - 0,6 мл, от 3 до 6 лет - 1 мл, от 6 до 12 лет - 1,5 мл. Применять разовую дозу 1-3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, внутривенных (струйно) инъекций, а также в акупунктурные точки.

Курс лечения - 2-5 недель.

## **Дети**

Опыт применения у детей в возрасте до 1 года отсутствует.

## **Передозировка**

Передозировка не отмечалась и не ожидается благодаря гомеопатическим разведением веществ, входящих в состав данного лекарственного средства.

## **Побочные реакции**

Возможны реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции со стороны кожи; изменения в месте введения, в том числе покраснение/отек.

## **Срок годности**

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

По рецепту.

## **Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).