

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит Belladonna D6 15 мг, Chamomilla D6 15 мг, Ferrum phosphoricum D6 15 мг, Hepar sulfuris D12 15 мг, Pulsatilla D6 15 мг

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, тальк, лактоза, магния стеарат.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* белого или почти белого цвета двухплоскостных таблетки со скошенной гранью.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Активные компоненты лекарственного средства уменьшают болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (ушной болью), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.

## **Показания**

Болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (ушной болью), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

## **Особенности применения**

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При отсутствии улучшения после 3 дней лечения следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Лекарственное средство предназначено для применения детям.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Лекарственное средство предназначено для применения детям.

### **Способ применения и дозы**

*Детям от рождения до 1 года*

при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 1 таблетке каждый час, но не более 6 таблеток в сутки после ослабления симптоматики - по 1 таблетке 3 раза в сутки.

*Детям в возрасте от 1 года до 6 лет:*

при острых симптомах принимать в течение первых двух дней по 2 таблетки каждый час, но не более 12 таблеток в сутки после ослабления симптоматики - по 2 таблетки 3 раза в сутки.

Курс лечения: 2-4 дня в каждом случае прорезывания зубов. В зависимости от каждого конкретного случая прорезывания зубов возможные непрерывные переходы от курса к курсу или повторения курсов.

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им раствориться во рту. При лечении детей грудного возраста таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

### **Дети**

Препарат назначать детям от рождения до 6 лет.

### **Передозировка**

В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции, возможно временное ухудшение симптомов. При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Оттоштрассе 24 76227 Карлсруэ, Германия.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).