

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 г мази содержит Cardiospermum Ø 0,1 г;

*вспомогательные вещества:* спирт цетостеариловый (тип А) эмульгированный, парафин жидкий, парафин белый мягкий, октилдодеканол, вода очищенная, спирт бензиловый.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* гомогенная мазь от светло-желтого до желтовато-зеленоватого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Мазь Ирикар содержит природное активное вещество из тропической лианы Cardiospermum halicacabum (кардиоспермум), что способствует улучшению симптоматики при воспалительных заболеваниях кожи, сопровождающихся зудом, таких как нейродермит, аллергические кожные реакции и профессиональные экземы. При этом, в первую очередь, отмечается быстрое уменьшение зуда, утихает уже после короткого периода применения мази. Под действием мази Ирикар исчезают покраснение и отеки, проходит воспаление. Со временем исчезают и обусловленные непрерывным чесыванием утолщение кожи и шелушение по типу экземы.

## **Показания**

Экзема, нейродермит, сухость кожи с зудом, а также как симптоматическое лечение после укусов насекомых.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

До сих пор не обнаружены.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

### **Особенности применения**

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. В этом случае пациенту нужно прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае затяжного течения заболевания, появления неясных, новых жалоб, тяжелых воспалений кожи, гнойных поражений кожи или лихорадки о дальнейшем применении препарата пациенту необходимо проконсультироваться с врачом. Следует избегать контакта с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. Следует вымыть руки после нанесения мази. Ирикар содержит спирт цетостеариловый, что может вызвать раздражение кожи.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Ирикар в период беременности и кормления грудью следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения пользы для женщины и риска для плода (ребенка).

Перед применением лекарственного средства рекомендуется проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 1 года наносить мазь на пораженные участки кожи тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в сутки.

Ирикар хорошо переносится, поэтому его можно применять в течение длительного времени. Если после 1-2 недель лечения не наблюдается терапевтического эффекта, пациенту следует обратиться к врачу.

### **Дети**

Из-за недостаточности клинических данных не рекомендуется применять препарат детям в возрасте до 1 года.

## **Передозировка**

Вредные воздействия повышенных доз неизвестны.

## **Побочные реакции**

При применении лекарственных средств, содержащих в своем составе действующее вещество Cardiospermum, возможны реакции гиперчувствительности, включая покраснение, раздражение кожи, сыпь, крапивницу.

Спирт цетостеариловый, что входит в состав вспомогательных веществ, может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит). В этом случае пациенту следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 50 г мази в тубе; по 1 тубе в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ /  
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Оттоштрассе 24 76227 Карлсруэ, Германия /  
Ottostrasse 24 76227 Karlsruhe, Germany.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).