

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат спиртовые гомеопатические разведения: Jodum D6 - 0,1 мг, Thuja occidentalis D12 - 3 x 10⁻⁷ мг, Berberis, Fructus D4 - 20 мг, Eupatorium perfoliatum D6 - 0,3 мг;

1 г препарата содержит от 41 до 55 гранул;

вспомогательное вещество: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические.

Гранулы однородные, правильной шаровидной формы, белого с серым или кремовым оттенком цвета, без запаха, сладкие по вкусу.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексное гомеопатическое средство.

Фармакодинамика

Действие препарата обусловлено его активными компонентами. При приеме гомеопатической композиции прекращаются сопутствующие воспалительные явления со стороны насо- и ротоглотки.

Препарат быстро и почти полностью всасывается, в основном в полости рта и далее в желудочно-кишечном тракте, распределяется по тканям и жидкостям организма.

Не образует токсических метаболитов. Не депонируется в тканях организма.

Показания

В составе комплексной терапии при аденоидах, хроническом тонзиллите, респираторных заболеваниях, частых простудах у детей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компоненту препарата. При заболеваниях щитовидной железы.

Надлежащие меры безопасности при применении

Случайные короткие перерывы и пробелы приемов не очень сказываются на общем процессе лечения.

Информация для больных сахарным диабетом: 1 гранула сахарная содержит примерно 0,002 хлебной единицы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Значительных явлений несовместимости с лекарственными препаратами других групп не обнаружено.

Особенности применения

Во время приема гомеопатического средства возможно временное усиление имеющихся и наблюдавшихся ранее симптомов. При этом следует сделать перерыв на 5-7 дней и проконсультироваться с врачом. В период лечения нежелательны прививки.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка, после консультации врача.

Способ применения и дозы

Дети от 3 до 7 лет принимают по 8-10 гранул 1 раз в день за полчаса до еды или через полчаса после еды. Препарат рассасывают и не запивают. Принимают 5 дней, затем

2 дня перерыва.

Курс лечения не менее 2-х месяцев. Возможны повторные курсы после консультации с лечащим врачом.

Дети

Препарат не используют детям до 3 лет.

Передозировка

Сведений о случаях передозировки нет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте

Упаковка

По 20 граммов во флаконах. 1 флакон в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО "Биолик".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Ленина, 118.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).