

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 г геля содержит лидокаина гидрохлорида моногидрата - 20 мг, экстракт цветов ромашки (*Matricaria recutita* L.) (1: 4-5) (экстрагент этанол 50% (об. / об.) с 1,37% трометамолу) - 185 мг

*вспомогательные вещества:* бензалкония хлорид 50%, масло коры коричневого дерева, сахарин натрия, карбомер, трометамол, кислота муравьиная 98%, этанол 96%, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Гель.

*Основные физико-химические свойства:* желто-коричневого цвета гомогенный гель без твердых кристаллов.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для местного применения в стоматологии.

Код АТХ А01А D11.

## **Фармакодинамика**

Комбинация активных веществ в препарате обладает болеутоляющими, противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Лидокаин является сильным местноанестезирующим средством амидного вида. Механизм его действия основан на стабилизации клеточных мембран за счет блокады натриевых каналов.

Ромашка или жидкий экстракт ромашки содержит сложную смесь структурно различных противовоспалительных и антибактериальных свойств, объединенных для повышения общего лечебного эффекта. Терапевтически наиболее важны сесквитерпены, насчитывающих более 50% активных составных частей ромашки. Противовоспалительное действие ромашки обусловлено главным образом наличием хамазулена и (-) - альфа-бисаболола, также обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

## **Показания**

Лечение легких воспалительных поражений десен и слизистой оболочки полости рта.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к лидокаину или другим местноанестезирующим средствам амидного вида, к ромашке или другим компонентам препарата.

Повреждения слизистой оболочки полости рта.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Данные отсутствуют.

### **Особенности применения**

Высокие дозы не следует применять дольше указанного периода без консультации с врачом.

Следует избегать попадания препарата в глаза или на открытые раны. Руки следует тщательно вымыть после использования Камистад® - гель Н.

Препарат содержит раствор бензалкония хлорида, что может вызвать раздражение кожи.

Препарат может вызвать онемение языка, поэтому, после применения препарата следует с осторожностью употреблять пищу и напитки.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не выявлено влияния на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Имеет клинического опыта применения препарата в период беременности и кормления грудью, поэтому не следует применять в эти периоды.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым полоску Камистад® - гель Н длиной ½ см наносить на пораженные участки слизистой оболочки полости рта 3 раза в сутки, слегка массируя. Курс

лечения определяет индивидуально врач в зависимости от течения заболевания.

Детям старше 12 лет полоску Камистад® - гель Н длиной ½ см наносить на слизистую оболочку полости рта. Не применять более 3 раз в течение 24 часов.

Камистад® - гель Н применять к уменьшению воспаления слизистой оболочки полости рта.

## **Дети**

Не применять детям до 12 лет.

## **Передозировка**

В настоящее время ни одного случая по интоксикации или передозировки препаратом неизвестны.

## **Побочные реакции**

Частота проявлений случаев побочного действия определяется по следующим критериям:

очень часто ( $\geq 1 / 10$ ); часто ( $\geq 1 / 100$  до  $< 1/10$ ); нечасто ( $\geq 1 / 1000$  до  $< 1/100$ ); редко ( $\geq 1 / 10000$  до  $< 1/1000$ ); очень редко ( $\geq 1 / 10000$  или неизвестно).

### *Со стороны кожи и подкожной клетчатки*

Нечасто: после применения геля может возникнуть временное легкое жжение, раздражение, покраснение.

### *Со стороны иммунной системы*

Очень редко поскольку продукт содержит лидокаин, цинамон и ромашку, могут возникать аллергические реакции, включая контактные аллергические реакции, кожные высыпания, зуд, ангионевротический отек. Такие реакции также могут возникать у пациентов с гиперчувствительностью к растениям из семейства Астровых (полынь) и Перуанского бальзама (через перекрестную реакцию).

Если возникли какие-либо реакции гиперчувствительности, применение Камистад® - гель Н следует прекратить и обязательно обратиться за консультацией к врачу.

## **Срок годности**

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 30 ° С.

**Упаковка**

По 10 г геля в тубе; по 1 тубе в картонной коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

СТАДА Арцнаймиттель АГ (выпуск серии).

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Стадаштрассе 2-18, 61118 Бад Фильбель, Германия.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).