

Состав

действующие вещества: экстракт травы чабреца (Serpilli herba) жидкий (1: 1), калия бромид;

1 г сиропа содержит экстракт травы чабреца (Serpilli herba) жидкого (1: 1) (экстрагент - этанол 30%) 120 мг, калия бромид 10 мг

вспомогательные вещества: сироп сахарный, этанол 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: коричневого цвета жидкость с ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, используемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A10.

Фармакодинамика

Пертуссин ускоряет отхождение мокроты, оказывает смягчающее эффект и оказывает седативное действие. Лекарственное средство стимулирует мукоцилиарный клиренс. Содержание в экстракте чабреца эфирного масла, дубильных веществ, горечи обуславливают раздражение нервных окончаний (преимущественно парасимпатических), что усиливает выделение жидкого экстракта бронхиол, уменьшает вязкость бронхиального секрета. Усиливает отхаркивание мокроты, повышает активность мерцательного эпителия, улучшает дренажную функцию бронхиального дерева.

Фармакокинетика

Не изучали.

Показания

Симптоматическое лечение воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем: бронхиты, трахеиты, пневмонии, коклюш.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе бромидов или других растений семейства Губоцветных (Lamiaceae), а также чувствительность к сельдерея и пыльцы березы (возможна перекрестная реакция) возраст до 4 лет; декомпенсация сердечно-сосудистой системы, артериальная гипотензия, выраженный атеросклероз, анемия, болезни почек с нарушением их функций, сахарный диабет, алкоголизм.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна. При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу!

Особенности применения

При применении препарата следует придерживаться рекомендуемых доз.

Детям в возрасте от 4 до 6 лет препарат следует разводить кипяченой водой.

Если во время лечения ухудшается симптоматика и / или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом. Если в течение одной недели симптоматика сохраняется, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит 10 - 14 об. % Этанол (алкоголя), то есть 1,7 г / дозу (15 мл), что эквивалентно 34 мл пива, 14 мл вина в дозе. Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

Пертуссин содержит до 11,4 г сахарозы на дозу (15 мл). Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку препарат содержит спирт, пациентам следует проявлять осторожность при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

Способ применения и дозы

Применять внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет назначать по 1 столовой ложке (15 мл) 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 4 до 6 лет по ½ чайной ложки (2,5 мл) 3 раза в сутки, от 6 до 9 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3 раза в сутки, от 9 до 12 лет - по 1 десертной ложке (10 мл) 3 раза в сутки.

Детям до 6 лет разовую дозу препарата - ½ чайной ложки (2,5 мл) - необходимо растворить в 2 десертных ложках (20 мл) охлажденной прокипяченной воды.

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от течения заболевания, характера комплексной терапии и переносимости препарата.

Дети

Применять детям в возрасте от 4 лет по назначению врача.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

При длительном применении возможны явления бромизма: кожная сыпь, ринит, конъюнктивит, гастроэнтероколит, общая слабость, атаксия, брадикардия. Лечение бромизма заключается в прекращении приема препарата и усилении выведения солей брома (назначение больших количеств натрия хлорида, жидкости, мочегонных препаратов).

Возможны желудочно-кишечные расстройства (включая тошноту, рвоту, диарею).

Возможны аллергические реакции на составляющие препарата.

В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке!

Упаковка

По 100 г во флаконах с контролем первого вскрытия.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).