

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 баллон содержит прополиса 2,1 г;

*вспомогательные вещества:* этанол 96%, глицерин, хладон 134а.

## **Лекарственная форма**

Аэрозоль.

*Основные физико-химические свойства:* жидкость темно-желтого цвета с характерным запахом прополиса.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для применения в стоматологии. Противомикробные и антисептические препараты для местного применения в стоматологии. Код АТХ А01А В11.

## **Фармакодинамика**

Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и ранозаживляющее средство, действие которого обусловлено свойствами комплекса биологически активных веществ прополиса (флавоноиды, витамины, аминокислоты).

При местном применении всасывается менее 5% активного вещества.

## **Фармакокинетика**

Данные не представлены.

## **Показания**

Афтозные, катаральные, язвенные стоматиты, катаральные гингивиты, хронический тонзиллит.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата/продуктов пчеловодства, экзема (острые формы), кровотечения из пораженных участков слизистой оболочки.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не рекомендуется применять одновременно с другими антисептическими средствами и продуктами пчеловодства.

## **Особенности применения**

Перед применением препарата рекомендуется промыть ротовую полость теплой кипяченой водой.

Избегать попадания препарата в глаза.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат содержит 80% этанола 96%. При нажатии на головку распылителя в течение 1-2 секунд в ротовую полость вместе с препаратом попадает до 0,8 г этанола 96%, что не может негативно повлиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности препарат следует применять с учетом соотношения польза для матери/риск для плода. При необходимости применения препарата кормление грудью рекомендуется прекратить.

## **Способ применения и дозы**

Назначать взрослым и детям старше 12 лет для орошения пораженного участка в полости рта или горла. Перед применением с баллона, который необходимо держать только вертикально, следует снять защитный колпачок и, убедившись в чистоте распылителя, который есть в комплекте, надеть его на шток клапана. Свободный край распылителя ввести в полость рта, после чего легким нажатием на головку равномерно орошать препаратом пораженный участок. Закончив орошение, всегда необходимо закрывать баллон защитным колпачком.

После распыления препарата следует воздержаться от приема пищи и питья до прекращения жжения во рту.

Препарат применять 2-3 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспалительного процесса - 1-2 раза в день до полного выздоровления.

Курс лечения - 3-7 дней.

## **Дети**

Препарат не применять детям до 12 лет.

## **Передозировка**

Аллергические реакции, невыносимое жжение и сухость во рту. При значительной выраженности указанных симптомов следует промыть ротовую полость теплой кипяченой водой, а при наличии аллергических реакций - назначить антигистаминные препараты.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции, в том числе аллергический дерматит, зуд, сыпь, ангионевротический отек (отек Квинке).

*Со стороны дыхательной системы:* ларингоспазм, одышка.

*Со стороны желудочно-кишечного тракта:* тошнота.

*Со стороны кожи и ее производных:* гиперемия кожи.

*Местные эффекты:* ощущение легкого жжения языка, сухость во рту.

## **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Оберегать от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

## **Упаковка**

По 50 г в баллоне аэрозольном алюминиевом, по 1 баллона с распылителем в пачке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

АО «Стома».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61105, г. Харьков, ул. Ньютона, 3.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).