

## **Состав**

*действующее вещество:* прополис;

1 баллон содержит прополиса 1,5 г;

*вспомогательные вещества:* этанол (96 %), глицерин.

## **Лекарственная форма**

Спрей для ротовой полости.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость темно-желтого цвета с характерным запахом прополиса.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для применения в стоматологии. Противомикробные и антисептические лекарственные средства для местного применения в стоматологии.

Код АТХ А01А В11.

## **Фармакодинамика**

Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и ранозаживляющее средство, действие которого обусловлено свойствами комплекса биологически активных веществ прополиса (флавоноиды, витамины, аминокислоты).

## **Фармакокинетика**

Данные не представлены.

## **Показания**

Местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки ротовой полости: афтозных, катаральных, язвенных стоматитов, катаральных гингивитов, тонзиллита, глосситов.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства/ продуктам пчеловодства, экзема (острые формы), кровотечения из пораженных участков слизистой оболочки.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не рекомендуется применять одновременно с другими антисептическими средствами и продуктами пчеловодства.

## **Особенности применения**

Избегать попадания лекарственного средства в глаза, поскольку оно содержит этанол.

Перед применением лекарственного средства рекомендуется промыть ротовую полость теплой кипяченой водой. Поскольку лекарственное средство содержит этанол, его следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями печени. После орошения ротовой полости лекарственным средством следует воздерживаться от приема пищи в течение 15–30 минут.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Лекарственное средство содержит 80 % этанола 96 %. При нажатии на головку распылителя в течение 1–2 секунд в ротовую полость вместе с лекарственным средством попадает до 0,8 г этанола 96 %, что не может негативно повлиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

В период беременности лекарственное средство следует применять с учетом соотношения польза для матери/ риск для плода. При необходимости применения лекарственного средства кормление грудью рекомендуется прекратить.

## **Способ применения и дозы**

Лекарственное средство применять взрослым и детям с 12 лет для орошения пораженного участка в ротовой полости. В начале лечения лекарственное средство применять 2–3 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспалительного процесса – 1–2 раза в сутки до полного выздоровления. Курс лечения – 3–7 дней.

### *Правила пользования баллоном.*

1. Снять защитный колпачок с баллона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.
2. Держа баллон вертикально, нажать несколько раз на распылитель до появления первых капель жидкости.
3. Свободный конец распылителя ввести в ротовую полость и, направив распылитель на пораженный участок, нажать на головку распылителя 1-2 раза и равномерно оросить лекарственным средством участок ротовой полости.
4. После распыления лекарственного средства следует воздерживаться от приема пищи и питья до прекращения жжения в ротовой полости.
5. Закончив орошение, всегда необходимо закрывать баллон защитным колпачком.

*Уход за распылителем.* Во избежание закупорки распылителя, его следует промыть под струей теплой воды и, стряхнув остатки воды, просушить в теплом месте, не подвергая воздействию высокой температуры.

### **Дети**

Лекарственное средство не применять детям до 12 лет.

### **Передозировка**

*Симптомы:* аллергические реакции, невыносимое жжение и сухость в ротовой полости.

*Лечение:* при значительной выраженности указанных симптомов следует промыть ротовую полость теплой кипяченой водой, а при наличии аллергических реакций – назначить антигистаминные лекарственные средства.

### **Побочные реакции**

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе аллергический дерматит, гиперемия, зуд кожи, сыпь, ларингоспазм, одышка, отек Квинке.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота.

Местные эффекты: чувство легкого жжения языка, сухость во рту.

### **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

## **Упаковка**

По 25 г в баллоне аэрозольном с клапаном насосного типа; по 1 баллону с распылителем и защитным колпачком в пачке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

АО «СТОМА».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61105, г. Харьков, ул. Ньютона, 3.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).