

Состав

действующее вещество: шалфей листья (Salviae folia)

1 пачка содержит шалфей листья (Salviae folia) 50 г.

Лекарственная форма

Листьев.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев различной формы с примесью стеблей и цветков зеленого, серовато-зеленого или серебристо-белого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества листьев уплотняют эпителиальные ткани, снижают проницаемость клеточных мембран, укрепляют стенки поврежденных кровеносных сосудов. Оказывают вяжущее, противовоспалительное, антисептическое и кровоостанавливающее действие.

Показания

Заболевания ротовой полости (стоматиты, гингивиты, пародонтозы) и верхних дыхательных путей (ларингиты, фарингиты, трахеиты).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода / ребенка.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Внешне применять для ингаляций и полосканий 3-4 раза в сутки: взрослым и детям старше 12 лет - в неразбавленном виде, детям 7-12 лет - 4 столовые ложки настоя развести в 200 мл кипяченой воды; детям 3-7 лет - 2 столовые ложки настоя развести в 200 мл кипяченой воды.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 2-8 ° С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет по назначению врача.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных реакций.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.