

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 таблетка содержит хлорофиллипта экстракта густого (10,76: 1) (экстрагент этанол 93%) 25 мг;

*вспомогательные вещества:* сахар, аскорбиновая кислота, кальция стеарат.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* таблетки от светло-зеленого до зеленого цвета с вкраплениями, плоскоцилиндрические, с риской и фаской, со специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Хлорофиллипт является смесью хлорофиллов из листьев эвкалипта. Препарат оказывает антибактериальное (бактериостатическое и бактерицидное) действие в отношении стафилококков, а также антисептическое и противовоспалительное действие.

## **Фармакокинетика**

Не исследована.

## **Показания**

Заболевания верхних дыхательных путей (тонзиллиты, фарингиты, ларингиты), а также афтозные и язвенные стоматиты.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к хлорофиллипту или другим компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Усиливает действие антисептических препаратов.

### **Особенности применения**

Перед началом применения необходимо посоветоваться с врачом.

После первого применения следует сделать паузу на 6-8 часов. Курсовое лечение препаратом возможно после подтверждения отсутствия аллергической реакции на экстракт хлорофиллипта густого (вероятность отека губ, слизистой оболочки носа, зева и других аллергических реакций). Если появились какие-либо из приведенных симптомов, прием препарата необходимо прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не исследована.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Эффективность и безопасность применения препарата в период беременности и кормления грудью не изучали, поэтому не следует применять этой категории пациентов.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым назначать таблетки по 12,5 мг или 25 мг в зависимости от степени тяжести патологического процесса. Таблетки не глотать и не разжевывать, а держать во рту до полного рассасывания. Суточная доза - 25 мг 5 раз в сутки. Кратность приема - 1 таблетка (12,5 мг или 25 мг) каждые 4-5 часов. Курс лечения - 7 дней.

### **Дети**

Нет опыта применения препарата у детей.

### **Передозировка**

Возможно усиление побочных реакций.

### **Побочные реакции**

Аллергические реакции, включая сыпь, зуд, ангионевротический отек, гиперемия.

Со стороны пищеварительного тракта: раздражение слизистой оболочки ротовой полости, тошнота, рвота.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 ° С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 40 таблеток в контейнерах.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод» ГНЦЛС ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61057, Харьковская обл., Город Харьков, улица Воробьева, дом 8.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).