

Состав

действующие вещества: 100 г раствора содержат экстракта жидкого (0,65: 1) из смеси сырья: цветков ромашки (*Matricaria chamomilla* L.) - 13 г, коры дуба (*Quercus robur* L.) - 13 г, листья шалфея (*Salvia officinalis* L.) - 13 г, травы арники (*Arnica montana* L.) - 6,5 г, корневища аира (*Acorus calamus* L.) - 6,5 г, травы мяты перечной (*Mentha piperita* L.) - 6,5 г, травы чабреца (*Thymus vulgaris* L.) - 6,5 г; экстрагент: этанол 70% (м/м);
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для ротовой полости.

Основные физико-химические свойства: непрозрачная жидкость темно-коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для местного применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает вяжущее, смягчающее, противовоспалительное действие на слизистую оболочку полости рта благодаря экстрактам коры дуба, цветков ромашки и листьев шалфея. Кроме того, дубильные вещества и эфирные масла, содержащиеся в препарате, оказывают антисептическое, антибактериальное и противогрибковое действие на слизистую оболочку полости рта и десен. Тесты *in vitro* показали, что эфирные масла шалфея и ромашки оказывают бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также фунгицидное действие в отношении *Candida albicans*.

Показания

Лекарственное средство предназначено для применения лицам старше 6 лет как противовоспалительное, антибактериальное, дезинфицирующее и вяжущее средство при:

- воспалениях слизистой оболочки рта и горла;
- гингивитах и стоматитах (в том числе при глоситах);
- поверхностных периодонтитах;

- склонности к кровотечениям из десен;
- в составе комплексной терапии при пародонтозе.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или других растений семейства губоцветных (Lamiaceae), а также к сельдерею и пыльце березы (возможна перекрестная реакция), повышенная чувствительность к арнике, ромашке или другим растениям семейства сложноцветных (Asteraceae); бронхиальная астма.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестны.

Особенности применения

Если симптоматика сохраняется в течение одной недели или ухудшается во время лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.

10 мл препарата содержат до 5,67 г этанола, следует принимать во внимание при применении лекарственного средства беременным, женщинам в период лактации, детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Непосредственно после применения лекарственного средства алкоголь можно выявить с помощью измерительных приборов во выдыхаемом воздухе. При применении в соответствии с инструкцией лекарственное средство не должно влиять на способность управлять транспортными средствами или работе с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

Способ применения и дозы

Применяют в виде полосканий 3-4 раза в сутки: взрослым - полоскать полость рта 15% водно-спиртовым раствором препарата (7,5 мл препарата растворить в ¼

стакана воды); детям от 6 лет применять после консультации с врачом - 10 мл препарата растворить в 1 стакане воды. Продолжительность лечения 7 дней. Если симптомы усиливаются или сохраняются, следует проконсультироваться с врачом.

Дети

В состав препарата входит этиловый спирт, поэтому не следует применять препарат детям в возрасте до 6 лет.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая гиперемию, зуд.

Местно - кратковременное ощущение жжения слизистой оболочки полости рта сразу после полоскания, а также обратимое изменение цвета зубов, которое исчезает при регулярной их чистке.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, темном месте при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фитофарм Кленка С. А., Польша.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Кленка 1, 63-040, Новое Мьясто над Стражей, Польша.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).