

## **Состав**

*действующие вещества:* 100 г раствора содержат 50 г экстракта жидкого (0,65: 1) из смеси сырья: цветков ромашки (*Matricaria chamomilla* L.) - 6,5 г, коры дуба (*Quercus robur* L.) - 6,5 г, листья шалфея (*Salvia officinalis* L.) - 6,5 г, травы арники (*Arnica montana* L.) - 3,25 г, корневища аира (*Acorus calamus* L.) - 3,25 г, травы мяты перечной (*Mentha piperita* L.) - 3,25 г, травы чабреца (*Thymus vulgaris* L.) - 3,25 г, анестезина 2 г экстрагент: этанол 70% (м / м);

*вспомогательные вещества:* натрия тетраборат, глицерин, метилцеллюлоза, этанол 96%, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Раствор для ротовой полости.

*Основные физико-химические свойства:* вязкая непрозрачная жидкость темно-коричневого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Другие препараты для местного применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

## **Фармакодинамика**

Лекарственное средство оказывает бактерицидное, противовоспалительное и вяжущее действие благодаря веществам из растительного сырья, которые входят в состав препарата (кора дуба, цветки ромашки, листья шалфея, трава чабреца, трава арники, трава мяты перечной, корневище аира). Благодаря анестезину, который содержится в Стоматофите А, препарат оказывает также анестезирующее действие. Более длительное действие препарата и его содержание на пораженном участке обеспечивают загустители (метилцеллюлоза, глицерин). Активен в отношении *Candida albicans*.

## **Показания**

Комплексное местное лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта: гингивита, пародонтита, стоматита, глоссита.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим растениям семейства губоцветных (*Lamiaceae*), а также к сельдерею и пыльце березы

(возможна перекрестная реакция), повышенная чувствительность к арнике, ромашке или другим растениям семейства сложноцветных (Asteraceae), бронхиальная астма. Повышенная чувствительность к другим амидным анестетикам.

Не применять при открытых ранах.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестны.

### **Особенности применения**

Если симптоматика сохраняется в течение одной недели или ухудшается во время лечения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Лекарственное средство содержит 35-45% (об/об) этанола, следует принимать во внимание при применении лекарственного средства беременным, женщинам в период лактации, детям до 12 лет.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Непосредственно после применения препарата алкоголь можно обнаружить приборами для измерения алкоголя в выдыхаемом воздухе. По этой причине управлять транспортными и механическими средствами можно не ранее чем через 30 мин после применения препарата.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 12 лет обрабатывать пораженные участки с помощью ватной палочки, смоченной в препарате, минимум 3 раза в день.

Непосредственно после применения препарата не полоскать полость рта.

Продолжительность лечения 7 дней. Если симптомы усиливаются или сохраняются, следует проконсультироваться с врачом.

### **Дети**

В состав препарата входит этиловый спирт, поэтому не следует применять препарат детям в возрасте до 12 лет.

### **Передозировка**

О случаях передозировки не сообщалось. При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

### **Побочные реакции**

Гиперчувствительность, чувство жжения, лихорадка. Метгемоглобинемия. Кора дуба может окрашивать зубы и слизистую оболочку полости рта в темный цвет. Цвет зубов и слизистой оболочки полости рта восстанавливается при ежедневном их чистке. Кратковременное ощущение жжения на слизистой оболочке сразу после применения препарата также является преходящим. Глицерин, входящий в состав препарата, может вызвать раздражение кожи и слизистой оболочки.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, темном месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 25 мл во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Фитофарм Кленка С. А., Польша.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Кленка 1, 63-040, Новое Мьясто над Стражей, Польша.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).